

Fallbeispiel Physiotherapie

Guillain Barré und Femurschaft-Fraktur

Version: 14.12.2020

Informationen zum Fallbeispiel		
Name: Hr. Barren	Alter: 65 Jahre	Geschlecht: m
Diagnosen: Femurschaftfraktur mit Osteosynthese; Versorgung vor zwei Wochen St. n. Guillain barré (vor 2 Jahren)	Nebendiagnose(n): St. nach PFNA (Proximaler Femurnagel) vor zwei Wochen	
Biographische Angaben: Eidg. Dipl. Buchhalter, frühpensioniert mit IV Rente, macht seit 1 Jahr privat Steuern für sein nahes Umfeld.	Aktuelle Tätigkeiten / Aufgaben / Hobbys: Macht für Freunde Steuern, Hobbys: TV, Musik, Internet. Lesen (Früher: Musikverein, Turnverein)	
Soziale Einbettung / Unterstützung: Lebt allein, nie verheiratet, keine Kinder, täglich Spitex für Körperpflege, 2 x pro Woche Spitex für Haushalt, Mahlzeitendienst. Kleines, aber verlässliches Umfeld (Nachbarn, Freunde), welche ihn bei externen Terminen unterstützen (Botengänge, spezielle Einkäufe).	Wohnsituation: Wohnt in einer grossräumigen 4 Zimmerwohnung (120 Quadratmeter). Zufahrt via Tiefgarage, Lift auf allen Stockwerken. Kleine Schwellen 2 cm innerhalb der Wohnung.	
Vorgeschichte / Grund für Behandlungsbeginn: Vor 2 Jahre Guillain barré. In der Folge zuerst 2 Monate Hospitalisation, dann 4 Monate Rehabilitation in Zielschlacht. In der Folge Wechsel in eine Langzeitinstitution, dort Fortführung der geriatrischen Rehabilitation. Nach 6 Monaten Austritt ins häusliche Umfeld. Zu Beginn je 1 x pro Woche PT/ET, seit 6 Monaten nun keine Therapien mehr. Seit 2 Monaten zunehmend Probleme mit der Ausscheidung. Inkontinenz nahm zu. Nun in der Nacht auf dem Weg zur Toilette gestürzt, Fraktur des Femurs, Hospitalisation mit OP.	Mobilität vor Sturzereignis / aktuelle Mobilität, Functional decline: Ist am Rollator wohnungsmobil. Macht alle Transfers selbständig. Hat einen Scooter; dieser steht in der Tiefgarage; er benutzte ihn seit 4 Monaten nicht mehr, obwohl es Sommer ist, da er sich beim Einsteigen zunehmend unsicherer fühlte.	
Hilfsmittel: Rollator Scooter Greifzange Alarmknopf	Medikation: Gerinnungshemmer Schmerzmedikamente Diuretica Blutdrucksenker	
Abklärungen: Sehr hohes Sturzrisiko. Mobilität massiv eingeschränkt. Massive Sturzangst.	Besondere Einflussfaktoren/ Kontraindikationen / Vorsichtssituationen: Belastung operiertes HG gemäss Massgaben der Beschwerden, bei erlaubter Vollbelastung bei St. n. Osteosynthese vor 14 Tagen.	
Aktuelle Situation im Verlauf: 2 Wochen postoperativ, Akutgeriatrie läuft in einer Woche aus.	Ziele der Patientin / des Patienten: Austritt nach Hause, keine weiteren Stürze	

Diskussion zum Fallbeispiel

Zielsetzungen und Interventionen:

Prognose und geplante Evaluation:

Beurteilung zum Fall und Koordination der interprofessionellen Zusammenarbeit:

Notizen: